

कुल पृष्ठ संख्या-32 (कवर पेज सहित)

क्रम संख्या 591346



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
उच्च माध्यमिक परीक्षा

(परीक्षार्थी द्वारा स्वयं भरा जाना चाहिये)



नोट :- परीक्षार्थी उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भी भाग में अपना नामांक नहीं लिखें।

माध्यम - हिन्दी ☒ अंग्रेजी ☐

विषय कृषि जीवविज्ञान

परीक्षा का दिन गुरुवार

दिनांक 28 - 03 - 2024

नोट :- परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश इस पृष्ठ के पिछले भाग पर उल्लेखित हैं। जिन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ लें व पालना अवश्य करें।

परीक्षक हेतु निर्देश :- (1) परीक्षक को उपरोक्त सारणी अनुसार प्राप्तांक भरना अनिवार्य है, अन्यथा नियमानुसार दंडित किया जायेगा।

(2) परीक्षक उत्तर पुस्तिका के अन्दर के पृष्ठों के बायीं ओर निर्धारित कॉलम में लाल इंक से अंक प्रदत्त करें।

(3) कुल योग भिन्न में प्राप्त होने पर उसे पूर्णांक में ही परिवर्तित कर अंकित करें (उदाहरणार्थ : $15\frac{1}{4}$ को 16, $17\frac{1}{2}$ को 18, $19\frac{3}{4}$ को 20)

प्रश्नवार प्राप्तांको की सारणी (परीक्षक के उपयोग हेतु)			
प्रश्नों की क्रम संख्या	प्राप्तांक	प्रश्नों की क्रम संख्या	प्राप्तांक
1	7½	19	4
2	5	20	4
3	8	21	1
4	1½	22	
5	1½	23	
6	1½	24	
7	1½	25	
8	1½	26	
9	1½	27	
10	1½	28	
11	1½	29	
12	1½	30	
13	1½	31	
14	1½	योग	55½
15	1½	प्राप्त अंको का कुल योग (Round off)	
16	3	अंकों में	शब्दों में
17	3	56	58.44
18	3		

परीक्षक के हस्ताक्षर

संकेतांक

31015

प्रमाणित किया जाता है कि इस उत्तर पुस्तिका के निर्माण में बोर्ड द्वारा प्रदत्त 58 जी.एस.एम. ईको मैपलिथो कागज ही उपयोग में लिया गया है। 177/2024

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

खण्ड 'अ'

①

(i) → (अ) कानपुर ।

(ii) → (स) फूलगोभी मौजिक वायरस ।

(iii) → (ब) पूसा जय किसान ।

(iv) → (द) लेपिडोप्टेरा ।

(v) → (अ) शिशु - घोंट ।

(vi) → (ब) डाइमिथीरट ।

(vii) → (स) मैना ।

(viii) → (ब) प्रो. मिलाई ।

(ix) → (अ) संक्रमण ।

(x) → (द) बालियो मै ।

(xi) → (स) जीवाणु द्वारा ।

(xii) → (अ) रिंग सूत्रकृमि ।

(xiii) → (द) उपर्युक्त सभी ।



परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

प्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

(XIV) → (अ) दो जीड़ी ,

(XV) → (ब) भोजन की पीसना ,

(XVI) → (स) गम्बुसिया ,

② (I) → ⁹⁹⁹जो हन्सन (1903) ,

(II) → गाम्थन ,

(III) → गुलाबी सडन कीट ,

(IV) → तीन खण्ड ,

(V) → वक्ष ,

(VI) → चूही के बिलों की ,

(VII) → आयरिस/दुर्गिक्ष ,

(VIII) → नम जलवायु वाले ,

(IX) → नैफ्रीडियल तंत्र ,

(X) → विरामिन 'ए' ,

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

(3) (i) → पादुप पुरस्थापन द्वारा नई फसलें व किस्में प्राप्त की जा सकती हैं -
नई फसलें - आलू , टमाटर , मटर ,
नई किस्में - धान की TN-1 , IR-8 , IR-28 ,
किस्में ,

(ii) → आवर्तीजनक → प्रतीप संकरण में बार-बार प्रयोग किए जाने वाले जनक को आवर्तीजनक कहते हैं।

(iii) → ट्रांसजेनिक पादप → वे पादप जिनमें किसी वांछित लक्षण के लिए कोई बाहरी जीन उपस्थित होता है उन्हें ट्रांसजेनिक (पारजीनी) पादप कहते हैं।

(iv) → कीटी के शरीर में प्रवेश करने के आधार पर कीटनाशियों को 3 वर्गों में बांटा गया है -
(A) संपर्क विष
(B) जठर विष
(C) धूमक

(v) → प्रकाश के अभाव या अंधकार की वजह से पौधों का पीला पड़ना पॉण्डुरता (Intoleration) कहते हैं।

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

(VI) → बैर की फल मक्खी के प्रकोप से सड़े हुए फलों को बाढ़ में गाड़ देना चाहिए या पशुओं को खिला दें। बैर के फल मटर के दाने के आकार के होने पर डाइमिथोएट 30 EC या क्लोथालफॉस 25 EC का 1m / Lt घोल का छिड़काव करें।

(VII) → खारे/लवणीय जल वाले सूत्रकृमि → कीटी स्टीमा, फ्रीमडीरा ।

(VIII) → व्यस्क → अश्वक अण्डा → अश्वक ।

(IX) →

खण्ड "ब"

(P) जननद्रव्य → किसी फसल या उसकी जंगली प्रजातियों की विभिन्न किस्मों व उसके सम्बन्धियों में उपास्थित सम्पूर्ण आनुवांशिक द्रव्य की उस फसल जननद्रव्य कहा जाता है।

जननद्रव्य को 'आनुवांशिक संसाधन' भी कहा जाता है।



जननद्रव्य का वर्गीकरण -


- (A) ग्राम्यन के आधार पर $\left\{ \begin{array}{l} \text{कृष्य जननद्रव्य} \\ \text{जंगली जननद्रव्य} \end{array} \right.$
- (B) उत्पत्ति के आधार पर $\left\{ \begin{array}{l} \text{देशी जननद्रव्य} \\ \text{विदेशी जननद्रव्य} \end{array} \right.$

15

14

5) कौशिका संवर्धन $\Rightarrow$ किसी पादप कौशिका की कृत्रिम पोष माध्यम पर संवर्धन करके नए पौधे तैयार करना, कौशिका संवर्धन कहलाता है।

कौशिका संवर्धन द्वितीयक उपापचयक उत्पन्न करने हेतु किया जाता है।



चित्र - कौशिका संवर्धन

P.T.O.

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

(6) कृत्रिम गुणसूत्र $\Rightarrow$ DNA खण्डी का स्थानान्तरण प्रायः वाहक द्वारा किया जाता है, परन्तु अधिक बड़े आकार के DNA खण्डी की वाहक स्थानान्तरित नहीं कर सकते इसलिए कृत्रिम गुणसूत्रों का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम गुणसूत्र का उपयोग वांछित DNA खण्डी का आतिथ्य कौशिका में स्थानान्तरित करने हेतु किया जाता है।

उदा. $\rightarrow$ (I) BAC (Bacterial Artificial Chromosome)
(II) YAC (Yeast कृत्रिम गुणसूत्र)

(7) फसलों के आधार पर कीटों का वर्गीकरण $\rightarrow$

(I) धान्य फसलों में लगने वाले कीट $\rightarrow$ तना छेदक प्ररोह मक्खी।

(II) दलहन फसलों वाले कीट $\rightarrow$ चने का फली वेधक।

(III) तिलहन फसलों के कीट $\rightarrow$ सरसों का मीथला, मूंगाफली का पर्ण सुरंगक।

(IV) फलवृक्षों वाले कीट $\rightarrow$ घ्वाल भक्षक, आम का फुदका, मिली बग।

(V) साब्जियों वाले कीट $\rightarrow$ बैंगन का तना व फल वेधक मटर में पर्ण सुरंगक।



(VI) भ्रूणधारण में लगाने वाले कीट → लाल सुरसाली
लाल सुरही, खपरा भृंग।

(8) प्रकाश पाशा → प्रकाश पाशा रात्रिचर कीटी जो प्रकाश
स्रोत की ओर आकर्षित होते हैं
उन कीटी के नियंत्रण में किया जाता है।
इसका उपयोग की रात्रिचर शालभी जैसे- कातरा
टिड्डी, सफ़ैट लट के भृंग, कटुआलट, चने की
फली वैधक के शालभी के विरुद्ध किया जाता है।

प्रकाश पाशा की कीटी के बहिर्गमन के समय (7:30 से
10:30 के बीच) कर लगाना चाहिए। इस हेतु प्रकाश
स्रोत के रूप अल्ट्रावायलेट ट्यूबलाइट या मर्करी वैपर
बल्ब सर्वोत्तम होता है। बल्ब के नीचे एक
पानी का ड्रम या मटका रख देते हैं जैसे ही
रात्रि में कीट प्रकाश स्रोत की ओर आकर्षित
होते हैं, वे पानी में गिरकर मर जाते हैं।

रात्रि 11 बजे के बाद प्रकाश पाशा नहीं लगाना चाहिए
अन्यथा मित्र कीट में मर सकते हैं।

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

(9)

DNA

RNA

कोशिकाद्रव्य

कोशिका
झिल्ली

(10) परजीवी कवक $\Rightarrow$ ऐसे कवक जो पोषण हेतु दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं परजीवी कवक कहलाते हैं।
परजीवी कवकों की तीन वर्गों में बाटा गया है -

(i) अविकल्पी परजीवी $\rightarrow$ ऐसे परजीवी जो केवल निश्चित परपोषी पर ही निर्भर रहते हैं इनकी उपयोगशाला में कृत्रिम माध्यम में नहीं उगाया जा सकता है।
उदा. - एल्बूगी, पाक्सिनिया, स्कैलीस्पोरा।

(ii) विकल्पी मृतजीवी $\rightarrow$ ये कवक वास्तव में तो परजीवी होते हैं परन्तु आवश्यकता पड़ने पर मृतजीवी के तरह मृत कार्बनिक पदार्थों से भी पोषण ग्रहण कर सकते हैं।
उदा. - अस्टीलैगी, ट्रेफीना।



(11) विकल्पी परजीवी → ये मुख्य रूप से मृतजीवी होते हैं परन्तु कुछ परिस्थितियों में परजीवी के रूप में परपोषी से पोषण प्राप्त कर सकते हैं,
उदा. - फ्यूजेरियम, पीथियम, सर्कोस्पोरा,

(11) टमाटर का अगीती झुलसा रोग के लक्षण →

(i) टमाटर के 2-3 सप्ताह के पौधों में लक्षण दिखाई देते हैं,

(ii) पौधों के वायवीय भागों में जलासिक्त धब्बे दिखाई देते हैं,

(iii) पौधों की पत्तियां जली हुई तथा झुलस जाती हैं,

(iv) फल व फूल सड़ जाते हैं।

(v) पुराने धब्बों के चारों ओर गोल घूमती हुई हल्के रंग की संकेन्द्रीय लाइनें बन जाती हैं जिससे 'लक्ष्य पट्ट प्रभाव' दिखाई देता है।

(12) साब्जियों के जड़ गन्धि रोग का प्रबन्धन →

(A) स्वास्थ्य प्रबन्धन → (i) रोगमुक्त नर्सरी से पौधे लेना चाहिए।

(ii) रोगग्रस्त पौधों को जला देना चाहिए।
(नष्ट करना)



परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

प्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

(11) रोपण सामग्री (प्रकन्द, कन्द, मूल) का उष्ण जल उपचार करना चाहिए। आलू के कन्दों की $46-47^{\circ}\text{C}$ ताप पर 1 घंटा, अदरक के प्रकन्दों की 56°C ताप पर 10 मिनट तथा शकरकन्द की 47°C ताप पर 65 मिनट तक उपचारित करना चाहिए।

(12) रासायनिक प्रबन्धन $\rightarrow$ पत्तों के बीजों की कार्बोफ्यूरीन व कैमिफोस तथा चकुन्दर की एल्डीकार्ब व कार्बोफ्यूरोन से उपचारित करके लगाना चाहिए।
1 kg एल्डीकार्ब या 2 kg कार्बोफ्यूरोन / सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर से ज्यादा उपचार करें।

(13) जैविक प्रबन्धन $\rightarrow$ रोग प्रतिरोधी किस्में -

(i) टमाटर - हिसार ललित, मंगला, पूसा सबी

(ii) बैंगन - ब्लैक व्युटी, पूसा जाइन्ट, पूसा परपल कलस्टर, कर्माटिका हाइब्रिड

(iii) मिर्च $\rightarrow$ बुलनीज, सूर्यमुखी, ज्वाला

(iv) मिठो $\rightarrow$ IC-9273, IC-18960, लॉन्ग ग्रीन स्मूथ

(13) स्लोग $\rightarrow$

वैज्ञानिक नाम - लाइमेक्स

संघ - मीलस्क

वर्ग - गैस्ट्रोपोडा

विवरण - नॉन-कॉर्डेटा

~~वर्ग~~

~~फैसीक्यूला~~

, वंश - लाइमेक्स



परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर
		स्लैग नम व हवायादार स्थानों पर पाये जाते हैं। ये कौठर आवरणवीदिन होते हैं जिनका शरीर अत्यन्त कोमल होता है। इसकी पुजाति काली स्लैग (लेबिकॉलिस ऐले) पान की ^{फसल} नर्सरी के पौधों को नुकसान पहुँचाती है। स्लैटी स्लैग (एनाडन्स) मक्का की फसल को तथा भूरी स्लैग (लाइमेक्स) कन्द वाली फसलों को नुकसान पहुँचाती है।

15 (14) टिड्डा : सामान्य परिचय -

वैज्ञानिक नाम - टिरीगलाइफस बेनियान

या टिरीगलाइफस निगोरिप्लैक्स

वर्गीकरण - संघ - आर्थ्रोपॉडा

वर्ग - इंसेक्टा

गण - ओर्थोप्टेरा

वंश - टिरीगलाइफस

विश्व में टिड्डे की 2500 पुजातियाँ पायी जाती हैं। इसे 'खेरीफ का टिड्डा' भी कहा जाता है।

टिड्डा एक विनाशकारी व सर्वभक्षी कीट है जो वनस्पति का शत्रु है। यह सभी प्रकार की वनस्पति को नुकसान पहुँचाता है या पूर्ण रूप से खा जाता है।

इसके जीवनचक्र की सभी अवस्थाएँ वनस्पतियों के लिए हानिकारक होती हैं।

टिड्डे का शरीर तीन खण्डों में बटा होता है -

(i) - सिर (ii) वक्ष (iii) - उदर

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

(15) पिस्सू का आर्थिक महत्व →

- (i) पिस्सू एक परजीवी कीट है जो सभी प्रकार के पालतू पशुओं व पक्षियों पर बाह्यपराजीवी के रूप में पाया जाता है,
- (ii) पिस्सू पालतू पशुओं का रक्त चूसकर क्षति पहुँचाता है,
- (iii) पिस्सू के काटे गए भाग पर एलर्जी व खुजली हो जाती है,
- (iv) पिस्सू के कारण खून की कमी (एनीमिया) तथा बालों का गिरना जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती जाती हैं,
- (v) पिस्सू सक्रामक रोगों की रोगी पशु में से स्वस्थ पशुओं में फैलाकर संचरण का कार्य करता है,
- (vi) यूरोप में पिस्सू के कारण चूहों से उत्पन्न रोग (प्लेग) फैला था जिसमें लाखों लोग मारे गए।
- (vii) पिस्सू के नियंत्रण के लिए चिकित्सकीय व्यय करना पड़ता है।

खण्ड "स"


(16) बहुगुणिता $\Rightarrow$ किसी जीव के दैनिक गुणसूत्र संख्या (n) में अधिकता होना बहुगुणिता कहलाता है।

द्विगुणित गुणसूत्र संख्या ($2n$) में कुछ गुणसूत्रों की कमी या वृद्धि होने को संख्यात्मक गुणसूत्र विपथन कहते हैं।

बहुगुणिता के प्रकार $\Rightarrow$

(*) असुगुणिता $\Rightarrow$

बहुगुणिता



अगुणिता/एकगुणिता

एक संजीन की केवल एक प्रति (n)

स्वबहुगुणिता

एक संजीन के दो प्रति ($2n$)

परबहुगुणिता

दो भिन्न संजीन

परचतुर्गुणिता

परषट्गुणिता

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

(I) असुगुणिता $\rightarrow$ किसी कौशिका में सामान्य गुणसूत्र संख्या $(2n)$ से एक या एक अधिक गुणसूत्रों की कमी या वृद्धि होना। असुगुणिता कहलाता है जैसे - $2n+1$, $2n+2$, $2n-1$ ।

(II) सुगुणिता $\rightarrow$ किसी कौशिका की सामान्य (द्रोढ़क) गुणसूत्र संख्या $(2n)$ से अधिक पतियाँ होना, सुगुणिता कहलाता है जैसे - $2n$, $3n$, $4n$ ।

(17) लीवर फ्लूक $\Rightarrow$

वैज्ञानिक नाम - फैंसियोला हेपेटिका

वर्गीकरण $\rightarrow$

संघ - मीलस्का

वर्ग - ट्रिमेटीडा

गण - डाइजीनिया

विभाग - नॉन - कॉर्डेटा

(I) यकृत कृमि का शरीर चपटे कृमि के समान $1.8 - 3 \text{ cm}$ लम्बा होता है।

(II) इसका रंग हल्का गुलाबी / पीला होता है।

(III) इसमें अवाह्यवीथ / त्वचीय श्वसन होता है।

(IV) इसका अग्र व पश्च भाग संकरा तथा मध्य भाग चौड़ा होता है।

(V) मुख के अतिरिक्त इसमें दो छिद्र - श्वसन छिद्र व उत्सर्जन छिद्र होता है।

(VI) इसमें दो यूपक अग्र व अधर भाग पर होते हैं।

आर्थिक महत्व →

- (i) यह बीड़ - बकरी में अधिक पाया जाता है इसके का पशुओं में यकृत विगलन (LIVER ROT) रोग होता है।
- (ii) पित्ताशय के कैल्सिभवन के कारण पशुओं में पचरिया हो जाता है।
- (iii) पशु के जबड़ों में पानी से भरे हुए छाले व फफोले हो जाते हैं।
- (iv) पशु में पाचन संबंधित रोग हो जाते हैं व पाचन क्रिया खराब हो जाती है।
- (v) भूख में कमी के कारण ऊन गिरने लगती है।
- (vi) रूब की कमी तथा दुग्ध उत्पादन घट जाता है।
- (vii) उग्र रूप में पशु की मृत्यु हो जाती है, पशु तभी जीवित बच पाता जब पलूक पशु के आमाशय से होकर मल के साथ बाहर निकल जाता है।
- (viii) पशुओं की मौलस्कनाशी व कीटनाशी दवाइयाँ दी जानी चाहिए।

①४ रीट्टू मध्वली → वैज्ञानिक नाम - लेबियो रीट्टा

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या


परीक्षार्थी उत्तर

बाह्य संरचना →

- (i) यह नाव / नौक के आकार की मछली है।
- (ii) इसका शरीर शल्की से ढका रहता है तथा मुख पर शल्क नहीं पाए जाते हैं।
- (iii) इसमें गलफड़े पाए जाते हैं जिनसे यह मछली श्वसन करती है।
- (iv) इसमें दो प्रकार के पंख जाते हैं।
- (v) रीढ़ मछली का शरीर ऊपर (पीठ की तरफ से) से काला परन्तु नीचे पेट की तरह सुनहरा पीला होता है।
- (vi) इसे राजस्थान में अधिकता में पाला जाता है।
- (vii) 2 वर्ष की आयु में इसका अनुमानित वजन 2kg, एक वर्ष की आयु में 1.50 kg होता है।
- (viii) इसका भार शीघ्रता से बढ़ता है इसका अधिकतम वजन 5 kg होता है।
- (ix) इसकी अन्य मछलियों के साथ भी पाला जा सकता है।

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर



चित्र - रीटू मछली

खण्ड "द"(19) टिड्डा ⇒वैज्ञानिक नाम - सिस्टीससिस्टीसक गिर्गैरिया

संघ - ऑर्थोपैडा

वर्ग - इंसैक्टा

गण - ऑर्थोपैरा

कुल - एकरीडिडि

जीवनचक्र - (i) टिड्डा शीत व ग्रीष्म ऋतु में दो बार जनन करता है।

(ii) इसका मादा व्यस्क मदा में अ चावल के दाने के समान धूरे रंग के अण्डे देती है।

(iii) एक मादा अपने जीवनकाल में 500 अण्डे देती है।

(iv) मादा बलुई मदा में अण्डे देना पसन्द करती है तथा मदा की सतह पर 10-15 cm में अण्डे देती है।

(v) इन अण्डों से अण्डक (व्यस्क का छोटा रूप) का निर्माण होता है। इसमें 10-40 दिन का समय लगता है।



परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

प्रश्न
संख्या


परीक्षार्थी उत्तर

(vi) टिड्डे में अण्डे को छोड़कर सभी अवस्थाएँ वनस्पतियों के लिए हानिकारक होती हैं।

(vii) यह सर्वभक्षी प्रकार का कीट है जो सभी वनस्पतियों को नुकसान पहुँचाता है।

(viii) अर्धक त्वचा का निर्माण का 2-3 सप्ताह बाद व्यस्क का निर्माण करता है।

(ix) टिड्डे की एक वर्ष में ~~दो~~ पीढ़ियाँ बनती हैं।



क्षति → टिड्डा सभी प्रकार की खरीफ की फसलों ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, कपास सभी को नुकसान पहुँचाता है। यह सभी प्रकार की दूरी वनस्पति को सम्पूर्ण रूप से खा जाता है। यह आक, नीम, शीशम जामुन को छोड़कर सभी प्रकार की वनस्पति के लिए हानिकारक है। क्षति की मात्रा कीटों की संख्या पर निर्भर करती है।



प्रबन्धन $\rightarrow$

(A) शास्य प्रबन्धन $\rightarrow$ (i) नीम के तेल या निम्बोली के श्रात का 5% का छिड़काव,

(ii) एकाक्ष पाक्षा व फ्लेम थ्रुअर की का प्रयोग करना।

(B) रासायनिक प्रबन्धन $\rightarrow$

(i) लिण्डेन चूर्ण 2% का छिड़काव,

(ii) अम्ली के रास्ते जहरीला चारा (गोधूँ की धूसी + मोडियम फ्लूओराइड या पैरिस ग्रीन + क्षीरा) मिलाकर रखना चाहिए।

(C) जैविक प्रबन्धन $\rightarrow$

(i) ट्रिक्सप्रोसेरस द्वारा अण्डों को नष्ट कर देना।

(ii) बैसिलस थुरिजिएंस जीवाणु का प्रयोग।

(90) मिठ्ठी का पीत क्षिरा मौजेक रोग $\rightarrow$

रोगजनक $\rightarrow$ यह रोग एक वायरस 'मिठ्ठी पीत क्षिरा मौजेक विषाणु' (BYMV) द्वारा होता है। यह बैगिमोवाइरस समूह का वायरस है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ ssRNA होता है।



परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

प्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

इसका संचरण सफ़ेद मक्खी (बैमिसिया टबाकी)
द्वारा होता है।

लक्षण → (i) संक्रमित पौधों की पत्तियाँ पीली
पड़ जाती हैं।

(ii) उग्र रूप में सम्पूर्ण पत्ती पीली हो जाती है
इसके साथ-2 शिराएँ भी पीली पड़ जाती
हैं।

(iii) पत्तियों में पीली शिराओं का जाल बन
जाता है।

(iv) प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में बाधा आती है।

(v) पौधे बौने रह जाते हैं, उनकी वृद्धि रुक
जाती है।

(vi) फल व फूल कम बनते हैं, उपज प्रभावित
होती है।

उपबन्धन →

शास्य उपबन्धन → (i) सफ़ेद मक्खी हेतु नीम के तेल
का छिड़काव करना।

(ii) संक्रमित पौधों को उखाड़कर नष्ट करना।

(iii) नर्सरी को नायलॉन नेट से ढकना।

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

⑧ रासायनिक नियंत्रण →

वाष्क सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण हेतु मिथाइल डिमिटीन
 $1 \text{ mL} / \text{Lt}$ घोल बनाकर छिड़काव करना।

डाइमिथोएट 30 EC $1.5 \text{ mL} / \text{Lt}$ का छिड़काव करना।

⑨ जैविक नियंत्रण → रोग रीढ़ी किस्म -

अक अकडिभय, पंजाब - 7
पंजाब पद्मिनी की बुवाई करना।

