

2823507

कुल पृष्ठ संख्या-32 (कवर पेज सहित)

क्रम संख्या



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

उच्च माध्यमिक परीक्षा



नोट :-

में अपना नामांक नहीं लिखें।

माध्यम - हिन्दी ☒ अंग्रेजी ☐

विषय - कृषि जीव विज्ञान

परीक्षा का दिन - शनिवार

दिनांक - 16-4-22

नोट :- परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश इस पृष्ठ के पिछले भाग पर उल्लेखित हैं। जिन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ लें व पालना अवश्य करें।

परीक्षक हेतु निर्देश :- (1) परीक्षक को उपरोक्त सारणी अनुसार प्राप्तांक भरना अनिवार्य हैं, अन्यथा नियमानुसार दंडित किया जायेगा।

(2) परीक्षक उत्तर पुस्तिका के अन्दर के पृष्ठों के बायीं ओर निर्धारित कॉलम में लाल इंक से अंक प्रदत्त करें।

(3) कुल योग भिन्न में प्राप्त होने पर उसे पूर्णांक में ही परिवर्तित कर अंकित करें (उदाहरणार्थ : 15 $\frac{1}{4}$ को 16, 17 $\frac{1}{2}$ को 18, 19 $\frac{3}{4}$ को 20)

प्रश्नवार प्राप्तांकों की सारणी (परीक्षक के उपयोग हेतु)			
प्रश्नों की क्रम संख्या	प्राप्तांक	प्रश्नों की क्रम संख्या	प्राप्तांक
1	9	19	4
2	4	20	1
3	8	21	
4	1 $\frac{1}{2}$	22	
5	1 $\frac{1}{2}$	23	
6	1 $\frac{1}{2}$	24	
7	1 $\frac{1}{2}$	25	
8	1 $\frac{1}{2}$	26	
9	1 $\frac{1}{2}$	27	
10	1 $\frac{1}{2}$	28	
11	1 $\frac{1}{2}$	29	
12	1 $\frac{1}{2}$	30	
13	1 $\frac{1}{2}$	31	
14	1	योग	55 $\frac{1}{2}$
15	1 $\frac{1}{2}$	प्राप्त अंकों का कुल योग (Round off)	
16	3	अंकों में	शब्दों में
17	3		
18	3		

परीक्षक के हस्ताक्षर संकेतांक 36276

प्रमाणित किया जाता है कि इस उत्तर पुस्तिका के निर्माण में 58 जी.एस.एम. ईको मैपलिथो कागज ही उपयोग में लिया गया है। 168/2021

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

(खण्ड-अ) भाग-अ

परीक्षार्थी उत्तर

प्रश्न 1

उत्तर

प्रश्न

उत्तर

(i)

स ✓

(ii)

ब ✓

(iii)

अ ✓

(iv)

द ✓

(v)

ब ✓

(vi)

ब ✓

(vii)

द ✓

(viii)

अ ✓

(ix)

स ✓

प्रश्न 2

उत्तर

(i)

पर्यायी की कोशिकाओं की संख्या बढ़ने से हुई उद्वृद्धि को अतिवृद्धि पर कहते हैं। लोरीया या अतिवृद्धि कहते हैं।

(ii)

टिड्डा अधोवृद्धि से वर्ग को संदर्भित है।

(iii)

पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाने वाला (Nif) जीन है।

(iv)

पारंपरिक फसलों की सबसे पुरानी विधि समूह चयन है।

प्रश्न 3

उत्तर

भिण्डी के पीत रंग मांजरेक रंग की रंगराधी किस्म है:-

(i)

पंजाब पदमिनी

(ii)

पंजाब-7



परीक्षक द्वारा प्रवृत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर
		(ii) सूत्रकृमि के पाचन तंत्र के दो अंग निम्न हैं:-
		(i) मुख
		(ii) गतसनी
		(iii) तमाटर के फूल कुचने रोग के कारण पतिया मुड़ी हुई ~~रूखी~~ विरूपित होकर मोहराबदार हो जाती है।
		(iv) रूंगीस्थानी छड़ छिड़ड़ा का वैज्ञानिक नाम सिस्टोसकी ~~ओगोरीया कारसकाल~~ होता है।
		(v) छ खरीफ फसलों में लगने वाले कीटों के नाम:-
		(i) सफेद लट्
		(ii) कातरा कीट
		(vi) जिन पादपों में वांछित लक्षणों के लिए बाहरी उपस्थित होता है ~~ट्रांसजेनिक~~ पादप कहलाते हैं। DNA
		(vii) YAC का पूरा नाम यीस्ट कृत्रिम गुणसूत्र होता है।
		(viii) धान का प्राथमिक उद्गम केंद्र भारत है।
		<u>खण्ड - व</u>

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

प्रश्न 4.

उत्तर


स्लैग के तीन लक्षण :-

(i) स्लैग शक्तिचर, उभयलिंगी, बारबाहरी
जन्तु है।(ii) स्लैग के सिर पर दो जोड़े अकुचनशील
स्पर्शक होते हैं। पश्च जोड़ी पर काल
नंग पाए जाते हैं।(iii) स्लैग के अधस्तन अधस्तल पूर चोड़ा,
चपटा तलव के समान पाए जाते हैं।

प्रश्न 5.

उत्तर

तारिकावरी



अवसर्ग

पुच्छ

चित्र: सूत्रकृमि संरचना

प्रश्न 6.

उत्तर

पादपों में जब कोई रोग सामान्य अवस्था में फैलकर
बहुत ज्यादा उग्र रूप ले लेता है तब मनुष्य
जातु को हानि पहुंचाने लगता है तो उसे पादप
महामारी रोग कहते हैं। जैसे: फांगस का लाल सड़न
रोग, आलु का पक्षेती अगमारी रोग।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर
प्रश्न नं. उत्तर		<u>आद्य जीवाणु</u> :- यह भूमि पर पाए जाने वाले ~~सबसे पुराने बैक्टीरिया हैं जो कार्बन परास्थितियों में भी जीवित रहते हैं~~ ~~उनकी कोशिका भित्ति में स्यूडोम्यूरीन होता है जो उनका कोशिका परास्थितियों में जीवित रहने में सहायता प्रदान करता है।~~ यह ~~चार प्रकार के होते हैं।~~ (i) ~~ठोस पानी के अरों में~~ (ii) ~~अम्लीय वातावरण में~~ (iii) ~~लवणीय वातावरण में~~ (iv) ~~जुगाली करने वाले पशुओं की आंत में~~
प्रश्न 8. उत्तर		<u>विषाणु के तीन लक्षण</u> :- (i) ~~विषाणु अविकल्पी परजीवी होता है जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही गुणन करता है~~ (ii) ~~विषाणु अकारिणीय होता है जो "न्यूक्लियो प्रोटीन" के बने होते हैं।~~ (iii) ~~विषाणु प्रोटीन के खोल से घिरा होता है जिस को कैप्सिड कहते हैं।~~
प्रश्न 9. उत्तर		चित्र: ~~कवक कोशिका~~

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

प्रश्न 10.

उत्तर

पादप उत्तक संवर्धन के तीन महत्व :-

(i) कार्यक क्लोनीय विविधता :- उत्तक संवर्धन में कार्यक क्लोनीय विविधता का उपयोग करके सूरसों की पुसा जाय किसान, जोकरकद की स्कालर्ट आदि किस्में बनाई गई हैं।


(ii)

(ii) समयुग्मज लार्सन :- सामान्यतः समयुग्मज लार्सनों की प्राप्ति करने में छह वर्ष का समय लगा जाता है लेकिन उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा दो वर्षों में प्राप्ति की जा सकती है, जापान, कनाडा में उपयोग करके कई व्यापारिक किस्में बनाई गई हैं।

(iii) साइब्रिड :- दो अलग-अलग प्रजातियों की कोशिकाओं के प्रांतोप्लास्टों के संलयन से बना कोशिका द्वय साइब्रिड कहलाता है।
जैसे कि - आलू, धान की किस्में बनाई गई हैं।

प्रश्न 11.

उत्तर





परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर
प्रश्न 12. उत्तर		किसी भी शुद्ध वंशक्रम में उपास्थित जीन प्रारूप एक समान होते हैं। उनके लक्षणप्रारूप में उपास्थित विविधता - वंशानुगत न होकर <u>वातावरण के कारण</u> होती है। वंशागत इसके दो दोष निम्न हैं:- (i) शुद्ध वंशक्रम में सुधार के लिए आनुवांशिक विविधता का उपास्थित होना आवश्यक है। (ii) शुद्ध वंशक्रम में आवर्ती जनक से अच्छा प्रतिक्रिया होती है। (iii) शुद्ध वंशक्रम से ख में प्राप्त हुई नई प्रभेद गुण किस्म की अपेक्षा कम अनुकूलित होती हैं।
प्रश्न 13. उत्तर		असुगुणित। किसी स्पर्शीय की कार्बिक कोशिकाओं में पाए जाने विगुणित गुणसूत्रों की संख्या के साथ ही एक या एक से अधिक या कम हो सकती है जैसे $2n+1$, $2n-1$। * असुगुणित के द्वारा पादप प्रजनन में कई नई किस्म प्राप्त की जा सकती हैं।
प्रश्न 14. उत्तर		प्रतीप संकरण विधि के कोई तीन गुण:- (i) वैज्ञानिक शोध के लिए विभिन्न किस्म प्राप्त हो जाती हैं।



परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

प्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

(ii) पादपाँव का रोग एवं कीट मुक्त क्षेत्रों में स्थापित करने से उनका नए रोगों एवं कीटों से बचाव होता है।

(iii) बिना चयन एवं संकरण के नई किस्मों प्राप्त की जा सकती हैं। जिस समय, श्रम एवं धन की बचत होती है।

प्रश्न 15.
उत्तर

किसी जीव के किसी लक्षण में होने वाले आकास्मिक एवं वंशानुगत परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं।

उत्परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं :-

(i) स्वतः उत्परिवर्तन :- जब उत्परिवर्तन भौतिक एवं रासायनिक उपचार करने से उत्पन्न होता है तो उसे स्वतः उत्परिवर्तन कहते हैं।

(ii) प्रेरित उत्परिवर्तन :- जब उत्परिवर्तन बिना किसी उत्परिवर्तन के उपचार करने से उत्पन्न होता है तो उसे प्रेरित उत्परिवर्तन कहते हैं।

10^{-7} - 10^{-4} प्रति जीन प्रति पीढ़ी होते हैं।

(ii) प्रेरित उत्परिवर्तन :- जब उत्परिवर्तन भौतिक एवं रासायनिक उपचार करने से उत्पन्न होता है तो उसे प्रेरित उत्परिवर्तन कहते हैं।

(खण्ड) भाग - स



परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

प्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

प्रश्न 16.

उत्तर

सात्वतियों के जड़ ग्रन्थि रोग के लक्षण :-

* पौधों की वृद्धि रुक जाती है।

* इसके लक्षण पौधों की जड़ एवं भूमिगत भागों पर दिखाई देते हैं।

* इस रोग से ग्रस्त रोगी पौधों श्वेत श्वेत में असमान रूप में अलग - अलग दिखाई देते व्योक्ति जड़ ग्रन्थि रोग असमान रूप से बिखरा हुआ दिखाई देते हैं।

* इस रोग से ग्रस्त पौधों की जड़ों में गांठ बन जाती है तथा गांठ वाले भाग में N.P.R का संचय अधिक होता है क्योंकि N.P.R ऊपर की ओर वितरित नहीं हो पाता है।

* जड़ों की गांठों में पीरिकाएँ बनना प्रारम्भ हो जाती है।

* इस रोग के लक्षण जब पौधे एक से दो मुहिन के हो जाए तब भूमिगत भागों में दिखाई देते हैं।

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

प्रश्न नं
उत्तर

वाजर का अग्रि रोग :-

रोगकारक (Pathogen) :- क्लॉस्त्रिडियम पेराजिफोमिस
इसका रोगजनक मूत्रा जनित
है जो बीजों के साथ मूत्र में पहुँचता है।

लक्षण (Symptoms) :- लक्षणों के आधार पर यह
रोग प्रकार का होता है।

(i) मधु विन्दु अवस्था :- इस अवस्था में हुलाबी शब्द
के समान द्रव्य प्रवाह की वृद्धि
पीछे की वालियों पर दिखाई देता है जो कुछ
समय बाद गहरे भूरे रंग की हो जाती है।

(ii) स्कलेरोसी अवस्था :- मधु विन्दु अवस्था के 10 दिन
बाद वालियों में दानों के स्थान गहरे भूरे
रंग के स्कलेरोसीपा बन जाते हैं।

रासायनिक प्रबंधन (Chemical Management) :-

वाजर को कार्बेन्ड सर्वांगी कवकनाशी कॉपर ऑक्सी
क्लोराइड (0.2%) या ऑक्सीक्वाथिक्सीन (0.2%)
या प्रापिकाना जिन (0.1%) का छिड़काव
दिनों के अन्तराल से करना चाहिए। 7-10



परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

प्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

प्रश्न 18
उत्तर

फड़का कीट का प्रबंधन :-

(i) सस्य प्रबंधन

(Cultural Management) :-

- * ~~खेत के समय या सुपे ड्रिप होने से पहले आगे या लपट फेंकने वाली यंत्रों को अच्छे को गूँथ कर देना चाहिए।~~
- * ~~बीम की निम्बाली के तेल का (0.1) % का छिड़काव करना चाहिए।~~

(ii) रासायनिक प्रबंधन

(Chemical Management) :-

- * ~~कीट के जनन स्थल के चारों ओर गहरी नाली खोदकर लिप्टोन की (0.2) का छिड़काव करना चाहिए।~~

- * ~~अच्छे के रास्ते में सांद्रिम परिस गरीन नामक विष को गूँथ की भुसी के साथ मिलाकर धोड़ा सा सिरा मिलाकर जहरीला चारा बनाकर फैला देते हैं।~~

(iii) जैविक प्रबंधन (Biological Management) :-

- * ~~ट्रोक्सोपोसेरस नामक कीट टिड्डी के सुंडों का बड़े चाव से खाता है इसलिए टिड्डी के जनन स्थल के चारों ओर इसका संरक्षण देकर नियंत्रित किया जा सकता है।~~
- * ~~(B.T) वासिलस थ्योरिजिस से टिड्डी या फड़के को नियंत्रित किया जा सकता है।~~

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

खण्ड - द

प्रश्न 19. मुगांकली का पौष्टिक (विषका) रोग :-

रोगजनक (Pathogen) :- इस रोग को लक्षणा के आधार पर दो भागों में बाटा गया है :-
(i) अर्गती पत्ती धलवा - सकरिपोरिड अरंकि डिकोला
(ii) पछती पत्ती धलवा - सकरिपोरिडियम परसोनटा

लक्षण (Symptoms) :- लक्षणा के आधार पर यह दो प्रकार का होता है।

क.समभाव	अर्गती पत्ती धलवा	पछती पत्ती धलवा
1. धल्व उत्पन्न होने का समय	बुवाई के 3-4 सप्ताह बुवाई के बाद पकट होते हैं।	बुवाई के 6-8 सप्ताह बुवाई के बाद पकट होते हैं।
2. धल्वों कारण व आकार व संख्या	इन धल्वों का रंग पीले भूरे या लाल भूरे से गहर भूरे रंग के होते हैं। इनका व्यास 1-10mm होता है। यह संख्या में कम होते हैं।	यह धल्व गहरे भूरे से काले रंग के होते हैं। इनका व्यास 1-6mm होता है। यह अधिक होते हैं।
3. हानिकारक	हानिकारक होते हैं।	अधिक हानिकारक होते हैं।
4. रोगजनक	सकरिपोरिड अरंकि डिकोला	सकरिपोरिडियम परसोनटा



परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

प्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

प्रबंधन (Management) : प्रबंधन निम्न
होता है। तीन प्रकार का

सस्य प्रबंधन (Cultural Management) :-

- * प्रमाणित एवं सुवर्ध बीजा का प्रयोग का
प्रयोग करना चाहिए।
- * क्षुब्ध तन्तु में खेत की गाहरी जुताई
करके खुला छोड़ देना चाहिए।

जैविक प्रबंधन (Biological management) :-

- * इस रोग के प्रकोप को कम करने के
लिए इस रोग की प्रतरोधी किस्मों जैसे :-
ICGS-10, VRI-3 का उपयोग करना चाहिए।

रासायनिक प्रबंधन (Chemical management) :-

- * कार्बीसिन एवं ऑक्सीकार्बीसिन सर्वांगी
कवकनाशी की 60-80% का घोल का
छिड़काव करना चाहिए।

- * पत्तियों पर करना चाहिए इस बीज का
छिड़काव।




प्रश्न 20.

उत्तर

कातरा कीट :-

वैज्ञानिक नाम :- एमसैक्ता मूरी

जीवन-चक्र :-



परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

प्रबंधन :-

प्रबंधन निम्न तीन प्रकार का होता है।

सस्य प्रबंधन :-

- * वृक्ष तहत में खेत की गहरी जुताई करके खुला छोड़ देना चाहिए।
- * खाद कातरा कीट अण्ड समूह में देता है अतः इनको पता लगाकर नष्ट कर देना चाहिए।

जैविक प्रबंधन :-

- * कातरा कीट के अण्डों को परजीव्याम त्राइकोग्रामा व टेलीनोमस से खर खाते हैं अतः उन्हें सरहाना देना चाहिए।
- * वृक्ष तहत में जुताई करके खुला छोड़ने से कुछ उच्च तापक्रम व कुछ जैविक जैसे मैना, बगुला द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं।

रासायनिक प्रबंधन :-

- * मैलाघयान 5% या बपुनॉल फॉस 25% के 5% का छिड़काव करना चाहिए।

- * कातरा कीट के प्रजनन स्थल को चारों ओर 30x30 cm की गहरी नाली खोदकर मैलाघयान या बपुनॉल फॉस के 5% का छिड़काव करना चाहिए।