

2626322


कुल पृष्ठ संख्या-32 (कवर पेज सहित)

क्रम संख्या



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

उच्च माध्यमिक परीक्षा



नोट :- परीक्षार्थी उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भी भाग में अपना नामांक नहीं लिखें।

माध्यम - हिन्दी ☒ अंग्रेजी ☐विषय कृषि रसायन विज्ञानपरीक्षा का दिन सोमवारदिनांक 11/04/2022

नोट :- परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश इस पृष्ठ के पिछले भाग पर उल्लेखित हैं। जिन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ लें व पालना अवश्य करें।

परीक्षक हेतु निर्देश :- (1) परीक्षक को उपरोक्त सारणी अनुसार प्राप्तांक भरना अनिवार्य हैं, अन्यथा नियमानुसार दंडित किया जायेगा।

(2) परीक्षक उत्तर पुस्तिका के अन्दर के पृष्ठों के बायीं ओर निर्धारित कॉलम में लाल इंक से अंक प्रदत्त करें।

(3) कुल योग भिन्न में प्राप्त होने पर उसे पूर्णांक में ही परिवर्तित कर अंकित करें (उदाहरणार्थ : 15 1/4 को 16, 17 1/2 को 18, 19 3/4 को 20)

प्रश्नवार प्राप्तांकों की सारणी
(परीक्षक के उपयोग हेतु)

प्रश्नों की क्रम संख्या	प्राप्तांक	प्रश्नों की क्रम संख्या	प्राप्तांक
1	09	19	04
2	04	20	04
3	08	21	
4	1 1/2	22	
5	1 1/2	23	
6	1 1/2	24	
7	1 1/2	25	
8	1 1/2	26	
9	1 1/2	27	
10	1 1/2	28	
11	1 1/2	29	
12	1 1/2	30	
13	1 1/2	31	
14	1 1/2	योग	56
15	1 1/2	प्राप्त अंकों का कुल योग (Round off)	
16	03	अंकों में	शब्दों में
17	03	56	छप्पन
18	03		

परीक्षक के हस्ताक्षर

संकेतांक

36180

प्रमाणित किया जाता है कि इस उत्तर पुस्तिका के निर्माण में 58 जी.एस.एम. ईको मैपलिथो कागज ही उपयोग में लिया गया है। 168/2021

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

(खण्ड - अ)

1	1.		
	(i)	गोबर की खाद (ब)	
1	(ii)	रमाइड (अ)	
1	(iii)	N, P, K (ब)	
1	(iv)	7.0 से कम (अ)	
1	(v)	6.5 से 7.5 (स)	
1	(vi)	200 Cmol/kg (ब)	
1	(vii)	3 (अ)	
1	(viii)	रिजका (स)	
1	(ix)	चूना-पत्थर (ब)	
	2.		
1	(i)	मृत्तिका कणों पर <u>प्रेक्ष्य/प्रेक्ष्यात्मक</u> आवेश पाये जाते हैं।	
1	(ii)	ह्यूमस का कार्बन-नाइट्रोजन अनुपात लगभग 10:1 होता है।	

परीक्षक द्वारा
प्रश्न अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

(1)

(iii) माइकोराइजा मृदा से लगातार फास्फोरस (पोषक तत्व) अवशोषित करता है।

(1)

(iv) सामान्यतः गाय के दूध में 4.9 प्रतिशत लैक्टोज पाया जाता है।

(1)

3.

(i) चूना पत्थर, बालू पत्थर।

(1)

(ii) जिस तत्व पर विद्युत आवेश होता है, उसे आयन कहते हैं।

(1)

(iii) 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा।

(1)

(iv) $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (कैल्शियम सल्फेट)

(1)

(v) डी. आर. नान ने।

(1)

(vi) $\text{NH}_2\text{CONHCONH}_2$ (बाइयूरेट)



(vii) आइसीनिया फोइटिडा ।

(पाँच) यदि दूध का pH मान 0.11 से 0.14 होता है, कमी-
यह 0.13-0.14

(iii) ताजा दूध हल्का अम्लीय होता है, इसका pH मान लगभग 6.7 या 6.8 होता है।

(खण्ड - ब)

9.

० संस्तर

A ^e संस्तर

B $\overline{KKK}$

C. ਸੰਸਾਰ

R. - (चरित्र)

Hand-drawn patterns on lined paper:

- Row 1: Four vertical lines with loops at the top.
- Row 2: Six 'x' marks.
- Row 3: Six 'o' marks.
- Row 4: Six 'v' marks.

पूर्ण विधायि (0,1)

अथ विचारिता (02)

4Rd (A,)

परिवर्त (A-)

1940 (F3)

61. विधि

62 M/S/

B3

C. અન્નપેત્ર

C₂ पर

1

मृदा परिवर्धिका:-



परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

प्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

मृदा का अध्वधिर (झड़ा) कार लगाने पर मृदा में विभिन्न समानान्तर संस्तर पाए जाते हैं, इन्हें मृदा परिच्छेदिका कहते हैं।

इसमें O, A, B, C व R संस्तर पाए जाते हैं।

इ. मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं -

- i) जलवायुवीय कारक
- ii) रासायनिक कारक
- iii) भौतिक एवं जैविक कारक

i) जलवायुवीय कारक :- मृदा निर्माण सतत रूप से जलवायु (वर्षा, ताप, आर्द्रता, नमी) से प्रभावित होता है, वर्षा अधिक होने पर चट्टानें अधिक विच्छेदित होगी तथा मृदा निर्माण भी अत्यधिक होगा।

ii) रासायनिक कारक :- चट्टानों एवं वातावरण में जितनी अधिक रासायनिक क्रियाएं होगी चट्टानें तीव्र गति से क्षीण होकर द्रव्यी तथा मृदा निर्माण भी अधिक होगा।



परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

प्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

iii) जैविक कारक :- सूक्ष्मजीवों, फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी आदि मृदा निम्नलिखित की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।

6. क्ले की मात्रा एवं प्रकार :-

सिलिकेट क्ले की मात्रा एवं उसका प्रकार धनायन विनिमय को प्रभावित करता है।

जैसे :- मोन्टमोरिलोनाइट समूह के क्ले मृदा में धनायन विनिमय सर्वाधिक होता है, अतः इसकी CEC सर्वाधिक होती है, $60-100 \text{ Cmol kg}^{-1}$ (80 औसतन)।

तथा कैओलिनाइट समूह की धनायन विनिमय क्षमता सबसे कम $3-15 \text{ Cmol kg}^{-1}$ व इलाइट क्ले की $20-40 \text{ Cmol kg}^{-1}$ होती है। अतः जिस मृदा में मोन्टमोरिलोनाइट अधिक होगी उसकी CEC भी अधिक होगी।

अतः हम कह सकते हैं कि मृत्तिका (clay) की मात्रा एवं प्रकार धनायन विनिमय क्षमता (CEC) को प्रभावित करता है।

7. धनायन विनिमय क्षमता एवम मृदा उर्वरता :-

एक क्लोग्राम शुष्क मृदा द्वारा H^+ आयन या इसके समतुल्य अन्य धनायन को अधिशोषित। ग्रहण करने की क्षमता को 'धनायन विनिमय क्षमता' कहा जाता है।



परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

प्रश्न
संख्या


यदि मूदा में Na^+ आयन्स को Ca^{+2} आयन्स द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो मूदा की संरचना में सुधार होता है, तथा मूदा उर्वरता में वृद्धि होती है, जिससे मूदा में उपजाऊपन बढ़ता है।

11. जिन मूदों में ग्रसम विनिमय अधिक होता है, वहाँ Na^+ आयन अन्य धनायनों को प्रतिस्थापित कर मूदा pH को बढ़ाता है, जिससे मूदा उर्वरता में कमी आती है, तथा ये पौधों की सन्तुलित वृद्धि नहीं हो पाती।

मूदा उदासीन pH 6.5-7.5 के मध्य अधिक उर्वर होती है।

8. शारीयकरण :-

जब मूदा संकीर्ण पर भस्मों का विनिमय होता है, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं पोटेशियम आयन्स के साथ-साथ सोडियम (Na^+) आयन्स भी प्रतिस्थापित हो जाते हैं, एवं मूदा संकीर्ण पर एकत्रित होने लगते हैं, जिससे मूदा में शारों की मात्रा बढ़ने लगती है, एवं मूदा ~~का~~ में शारों का बढ़ना। एकत्रित होना शारीयकरण कहलाता है। सोडियम द्वारा अन्य धनायनों को प्रतिस्थापित करना




9. झारीय मृदा में जिप्सम की अभिक्रिया —

झारीय मृदाओं के सुधार हेतु जिप्सम का प्रयोग किया जाता है।

→ जिप्सम में उपस्थित कैल्शियम झारीय मृदाओं में प्रबलता से उपस्थित सोडियम (Na^{+}) आयन को प्रतिस्थापित कर देता है।

→ सोडियम आयन जिप्सम के कैल्शियम आयन से क्रिया कर सोडियम सल्फेट बनाता है, जो लीचींग (निक्षालन) द्वारा नष्ट हो जाता है।




परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

12. यूरिया की मृदा अभिक्रिया:-

यूरिया में नाइट्रोजन एमोइड के रूप में होती है।

यूरिया मृदा में डालने पर जल से अभिक्रिया करता है-



→ यह अमोनियम तथा कार्बोनेट आयन में विघटित हो जाता है-



→ अमोनियम आयन मृदा संधीर्ण पर अवशोषित हो जाते हैं, या अल्प मात्रा में जीवाणु द्वारा नाइट्रेट में परिवर्तित कर पौधों को प्राप्त हो जाते हैं।



नाइट्रेट

→ अमोनियम आयन वायुमण्डल में हास हो जाता है।

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर


13. म्युरेट ऑफ पोटेश (MOP) :-

- इसे K^+ रूप में ग्रहण किया जाता है।
- इसे खड़ी फसल में ऊर कर या बिखेर कर देना चाहिए।
- इसमें क्लोरीन उपस्थित होने के कारण इसका प्रयोग आलू, गन्ना, चुकन्दर इत्यादि फसलों में नहीं करना चाहिए।
- यह 60% पोटेशियम पौधों को प्राप्त कराता है।
- इसे क्षारीय मृदा में उपयोग नहीं करना चाहिए।

14. सोडियम युक्त उर्वरक :-

इन उर्वरकों के प्रयोग से मृदा क्षारीय हो जाती है, यह मृदा पर क्षारीय प्रभाव डालते हैं।

धम:- सोडियम नाइट्रेट $[NaNO_3]$





परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर
----------------------------	---------------	-------------------

12) इन उर्वरकों के प्रयोग से मृदा संरचना खराब होती होती है, मृदा में बड़े-बड़े टुकड़े बन जाते हैं। वायु संचार कम होता है।

(ii) फसलों पर लौह तत्व के अधिक सान्द्रण से फसले ब्रांजिंग (ताँवे जैसी) रंग की हो जाती हैं, एवं पौधा मर जाता है।

15. सिंगल सुपर फास्फेट (SSP)

क) नमी की मात्रा (अधिकतम) = 1.0 से 1.2%.

ख) कुल फास्फोरस की मात्रा = 16%.

ग) सान्द्र सल्फ्यूरिक अम्ल = 4%.

(iii) बलोरिन की कमी से बरसीम में रसोत्कर्षण दाब कम होता है, तथा चौर। सैल्यूलोज की मात्रा कम होती है।

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

5. मृदा निर्माण को निम्न कारक प्रभावित करते हैं।

मृदा निर्माण

सक्रिय कारक

निष्क्रिय कारक

जलवायु

जैवमंडल

पैतृक पदार्थ


वर्षा

स्थानाकृति

तापक्रम

समय

ESER-168/2021



परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

(खण्ड-स)

16. ह्यूमस के रासायनिक गुण :-

- ह्यूमस में कार्बन 50-55%, ऑक्सीजन 30-35%, नाइट्रोजन 5%, हाइड्रोजन 5% उपस्थित होता है।
- ह्यूमस का कार्बन नत्रजन अनुपात 10:1 होता है।
- ह्यूमस की घनयन विनिमय क्षमता 100-300 Cmol/kg (900 Cmol/kg औसतन) होती है।
- ह्यूमस में प्रेरणात्मक समूह OH^- , COOH^- तथा फिनोलिक हैं।
- ह्यूमस की उभय प्रतिरोधन क्षमता अधिक होती है।
- ह्यूमस की जल धारण क्षमता एवं पृष्ठीय फैलाव अधिक होता है, तथा इसमें C, H, O आधार समूह हैं।

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

17. केओलिनाइट :-


इस समूह में मुख्यतया केओलिनाइट खनिज पाया जाता है।

- इसमें सिलिका एवं स्यूमिना की परत एक के बाद एक लगी होती है, इस संरचना को 1:1 टाइप संरचना कहते हैं।
- इसमें सिलिका एवं स्यूमिना की परत ऑक्सीजन एवं हाइड्रॉक्सिल (OH) आयन से जुड़ी होती है।

- इसमें धनायन विनिमय केवल पर ही होता है, अतः इसकी धनायन विनिमय क्षमता कम, सुघट्यता एवं संकुचन कम होता है।

- इसकी संरचना एवं परगम्यता अत्यधिक होती है।

संरचना सूत्र :- $Al_4 Si_4 O_{10} (OH)_2$





परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

प्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

धनात्मक	+	एल्यूमिना परत	+
	+	सिलिका परत	+
विमिश्रित	+	एल्यूमिना परत	+
	+	सिलिका परत	+

कम प्रसारीय दूरी

36

- कैओलिनाइट समूह -

18. मृदा पी.एच. का सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव :-

मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीवों की सक्रियता pH मान के साथ प्रभावित होती है।

• अधिकांशतः सूक्ष्म जीव उदासीन pH पर अधिक सक्रिय रहते हैं।

• बैक्टीरिया 5.5 से कम pH पर सक्रिय/क्रियाशील नहीं होता।

• जबकि 5 से कम pH पर फंजाई आसानी से कार्य कर लेते हैं।

• अतः मृदा pH पर सूक्ष्म की सक्रियता भिन्न pH पर भिन्न तरह से होती है।

• pH मान सूक्ष्म जीवों के अनुकूल रहने यह पौधों के लिए लाभदायक होता है।

36

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

सूक्ष्म जीव

pH मान

बैक्टीरिया

6.5 - 7.5

एक्टिनोमाइसिटोज

6.5 - 7.5

कवक

3.0 - 9.0

एल्गी

3.0 - 9.0

फंजाई

3.0 - 7.0

डिग्रेम

5.0 - 8.0

वैसिट्रियोमाइसिटोज

6.5 - 7.5

BSEB-168/2021

Previashala
Pathshala



परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर
		(खण्ड - द)
	19.	<u>दूध का औपेक्षिक घनत्व :-</u> दूध का औपेक्षिक घनत्व लैक्टोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। → दूध के इकाई भार आयतन में पानी के समान भार आयतन का अनुपात औपेक्षिक घनत्व कहलाता है। → उपकरण एवं सामग्री :- ① पेट्री डिश ② लैक्टोमीटर ③ बाइयरेट ④ दूध का नमूना ⑤ स्क्रापर <u>विधि :-</u> सर्वप्रथम काम में आने वाली सभी उपकरण को आसूत जल से धो लेते हैं। → तत्पश्चात् दूध के नमूने को 10ml एक ट्यूरेट में भर लेते हैं। → इसके बाद इसमें मिलाते हैं। → इसमें पाइयांक को नोट कर लेते हैं। → 60° को आसानी से अधिक पाइयांक होने पर प्रत्येक ° के लिए 0.2 बढ़ा देते हैं तथा लैक्टोमीटर पाइयांक से संशोधित लैक्टोमीटर (CLR) पाइयांक ज्ञात करते हैं।

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर


• ज्ञात की गई रिडिंग में 0.5 जोड़कर लिखते हैं। क्योंकि उस समय तक लेते हैं, जब तक अन्तिम दोनों पाठ्योंक समान न आ जाए।

उसे सूत्र = $1 + \frac{CLR}{1000}$ से ज्ञात करते हैं।

नमूना	ताप	L.R.	CLR	LA + 4	ऑपेसि धनत्व
A	60°F	30	30.5	30.5	1.32%
B	72°F	32	32.5	34.5	1.345%

04

BSER-168/2021





परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर
	१०	<u>कम्पोस्ट नोडोप विधि</u> यह विधि <u>महाराष्ट्र</u> के नोडोप काका कृषक द्वारा क्रिसित की गई। <u>आवश्यक सामग्री:-</u> i) खरपतवार, भूसा, फसल अवशेष - 1400-1500 Kg ii) गोबर - 90-100 Kg iii) सड़ी मिट्टी = 125 Kg iv) जल मौसमानुसार - 1750 ली. ⇒ इस विधि से <u>कम्पोस्ट</u> खाद तैयार करने के लिए 90-120 दिन का समय लगता है। $N = 0.4-1.35$ $P = 0.5-1.5$ $K = 1.2-1.4$ <u>टैंक तैयार करना:-</u> इस विधि के लिए $10 \times 6 \times 3$ (L x B x H) मी. का एक आयताकार टैंक तैयार करते हैं।



परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

प्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

इसमें ईंटों की जुड़ई मिट्टी से तथा ऊपरी ईंटों को सीमेंट से जोड़ते हैं, ताकि टैंक गिरे नहीं।
→ टैंक में एकान्तरूप क्रम में 75 से 9 इंच तक के छिद्र छोड़े जाते हैं।

→ यह छिद्र पहली, तीसरी, दूरी, नवी परत में छोड़े जाते हैं, एक के ऊपर दूसरा छिद्र नहीं आए इस बात का ध्यान रखते हैं।

पहली परत - भूसा, फसल अवशेष (100 kg)

दूसरी परत - गोबर मिट्टा हुआ जल (125 ml)

तीसरी परत - फसल अवशेष

उपरोक्त तीनों परतों के क्रम में टैंक को भरते हैं। तथा सबसे 75-100 सेमी परत को पहली तह से भरते हैं।

लगभग 11 से 12 तहों में टैंक भर जाता है। इसमें नियमित रूप से पानी का छिड़काव करते रहते हैं।

→ कुछ सप्ताह बाद टैंक 72 से 75 इंच बेंठ



परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर
		जाता है, उसे फिर से इसी क्रम में भरते हैं
		लगभग 90-120 दिन में कम्पोस्ट खाद बनकर तैयार हो जाती है
04		<u>संयोग:-</u> सामान्य फसल में 15-20 टन/हेक्. साजियों में 25 टन/हेक् की दर से संयोग करते हैं
HSER-168/2021		~~NOV 16 2021~~ 36180
		समाप्त